

5. *Hemiptera från Kafferlandet*. — Hr Studerande C. STÅL hade inlemnadt följande fortsättning af sina beskrifningar öfver de af Hr J. A. WAHLBERG hemförda Hemiptera.

ELASMOGASTER (STÅL).

(Öfvers. af K. Vet.-Ak. Förhandl. 1853, p. 259).

1. *E. brunnescens*: brunneus, rube punctatus, parce albosquamosus; antennis rufoferrugineis, art. 1 toto, 4 apice fuscis; corio ad membranam fuscocuprescentem sordide albido-marginato. Long. 16, lat. 8 millim. — In terra Natalensi.

Variat hemelytris abdomine multo brevioribus.

MICTIS (LEACH).

1. Tibiæ posticæ intus plus minus dilatatæ, inermes.

a. Thorax inermis.

1. *M. castanicornis*: fuscocastanea, parce flavosericea; antennis dilute castaneis, art. ultimo extus fuscescente; scutello medio longitudinaliter densius luteopiloso; membrana fuscocuprescente; abdomine subtus dilute brunnescente; pedibus ferrugineofuscis, tarsis castaneis; femoribus maris posticis ante medium nonnihil curvatis, dein subæqualiter incrassatis. Long. 23, lat. 8 millim. — In terra Natalensi.
2. *M. caffra*: fuscocastanea, luteosericans; antennarum art. 2—4 luteis, apice nigrofuscis; membrana fuscocuprescente; femoribus infra dilutioribus, tarsis fuscopiceis; femoribus maris posticis fusiformibus, intus medio et apicem versus bidentatis. Long. 22, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
3. *M. vidua*: castanea, parce luteosericans; antennis pedibusque rufoferrugineis, art. ultimo illarum lutescente; scutelli apice imo sordide albido; membrana cuprescente. Long. 20, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
4. *M. tomentovirgata*: dilute castanea, pilis albidis, in thorace lineis septem longitudinalibus formantibus, instructa; antennarum art. 3 ultimis dilute fulvescentibus, 2 et 3 apice nigris; corio medio longitudinaliter fuscescente; membrana cuprescente; pedibus obscure rufoferrugineis, dense albidosericeis. Long. 20, lat. 7 millim. — In terra Natalensi.
5. *M. griseosericans*: obscure rufoferruginea, griseosericea; antennis nigrofuscis, art. ultimo fulvescente, apicem versus fuscescente; femoribus supra nigrofuscis; femoribus maris posticis fusiformibus, medio subdentatis. Long. 16, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
6. *M. grallatoria*: obscure rufoferruginea, griseosericea; antennis nigris, art. ultimo fuscocastaneo; membrana fuscocuprescente; pedibus nigropiceis; femoribus posticis maris modice crassis, mox

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh., d. 10 Jan. 1855.

pone basin curvatis, dein subrectis, pone medium bidenticulatis. Long. 20, lat. 7 millim. — Ad portum Natalensem.

7. *M. lugubrina*: nigropicea, griseosericea; antennarum art. 2—4 fulvescentibus, 2 et 3 apice nigris; hemelytris castaneis, corio nonnihil fuscescente; membrana fuscocuprescente; femoribus maris posticis subrectis, fusiformibus, pone medium intus subdentatis. Long. 20, lat. 7 millim. — In terra Natalensi.
8. *M. natalensis*: rufoferruginea, parce flavosericea; antennarum art. 1 nigro, 2 et 3 fulvis, apice nigris, 4 fusco; thorace lateribus nigricantibus; pedibus nigropiceis. Long. 22, lat. 8 millim. — In terra Natalensi.
9. *M. amicta*: castanea, albidosericea; antennis fulvescentibus, art. 2—4 apice nigris; corii margine ad membranam cuprescentem densius albidosericeo; abdomine subtus dilutiore; tarsis fuscis; femoribus posticis maris subrectis, fusiformibus, pone medium subcrenulatis. Long. 16, lat. 5½ millim. — In terra Natalensi.

b. Thorax utrimque angulato-dilatatus.

10. *M. furva*: nigropicea, subtus dilutior; antennis nigris, art. ultimo fulvo; pectore utrimque pustula dilute sanguinea; abdomine maris subtus basin versus elevato, gibboso; femoribus maris posticis ante medium sat curvatis, dein æqualiter incrassatis, intus mox pone medium dente valido armatis. Long. 25, lat. 8 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.
11. *M. Bohemani*: præcedenti valde affinis, sed distincta antennis longioribus, angulis humeralibus thoracis magis acutis; femoribus posticis crassioribus, magis curvatis, abdominis segmento secundo subtus non gibboso. Long. 28, lat. 9 millim. — In terra Natalensi.
12. *M. validipes*. rufoferruginea, ochraceosericea; antennis nigrofuscis, art. ultimo sordide flavotestaceo; abdomine subtus basin versus valde elevato, gibboso; pedibus fuscopiceis, dense griseosericeis; femoribus posticis maris basin versus sat curvatis, dein æqualiter crassis, dente valido pone medium armatis. Long. 30, lat. 9 millim. — In terra Natalensi.

2. Tibiæ posticæ utrimque dilatatæ, inermes; thorax dilatatus.

13. *M. foliacipes*: fuscoferruginea; antennis sat longis, gracilibus, castaneis, art. 2 et 3 apice obscurioribus, ultimo dilute flavescente; pectore utrimque fascia obliqua dense sordide flavosericea; tibiis posticis præsertim basin versus utrimque valde dilatatis; femoribus posticis maris apicem versus sensim incrassatis, subbidentatis. Long. 24, lat. 9 millim. — In terra Natalensi.

PHYSOMERUS (BURM.).

1. *P. lugens*: obscure castaneus, granulosis, hirsutulus; antennarum art. 2 et 3 ochraceis, ultimo testaceo; thoracis lateribus nigrofuscis; membrana fuscobrunnea; subtus testaceus, abdomine serie

utrimque macularum fuscarum margineque segmentorum flavo.
Long. 11, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.

2. *P. granosus*: fuscofescens, granulatus, hirsutus et griseosericeus; antennarum art. 1 granulatus; thorace angulis humeralibus anteriorum productis, acutis, medio utrimque spina, disco tuberculis 2, instructis; membrana fuscomaculata; subtus dilutior, vitta abdominis utrimque obsolete fuscescente Long. 10, lat. $4\frac{3}{4}$ millim. — In terra Natalensi.

PETALOCNEMIS (STÅL).

(loc. cit. p. 259.)

1. *P. pachycerus*: totus dense cinereotomentosus et sericeus; antennarum art. ultimo, basi excepta, flavescens; membrana albida, parce fuscomaculata. Long. 13, lat. 5 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.

PARYPHES (AM. ET SERV.).

1. *P. hilarus*: dilute ferrugineus, fuscescente punctatus; thorace marginibus lateralibus fuscescentibus; antennis, pedibus subtusque dilute helvolus, pectore utrimque punctis 3 nigris. Long. 12, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

PHILONUS (DALLAS).

1. *P. nigrovittatus*: capite, thorace, subtus pedibusque fuscoferrugineus; antennis fulvis, art. 1 toto, 2 et 3 apice nigris, hoc apicem versus subdilato, 4 fuscofescens; hemelytris flavofescens, vitta inæquali nigra intramarginali ornata. Long. 17, lat. $5\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
2. *P. natalensis*: antennis fulvis, art. 2 et 3 apice nigris, 4 fuscofescens, basali pedibusque obscure rufoferrugineis; thorace fuscofescens; hemelytris dilute castaneis, corio vitta abbreviata nigricante; subtus fuscoferrugineus, margine abdominis dilutiore. Long. 17, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.

SERINETHA (SPIN.).

1. *S. moesta*: fusca; capite, antennis pedibusque nigrofuscis; tuberculis pone oculos, margine basali thoracis hemelytrorumque sordide flavis; subtus lutescens, albidomucorea. Long. 15, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

HYPSELOPUS (BURM.).

1. *H. annulicornis*: obscure rufoferrugineus, albidopilosulus; antennis art. 1 et 2 nigris, 3 luteo, apice nigro, 4 fusco, basi et apice flavoannulato; thorace flavorugoso, angulis humeralibus acutiusculis; tibiis posticis basin versus testaceoannulatis. Long. 19, lat. 5 millim. — In tractibus fluvii Gariep.
2. *H. linearis*: capite, antennis, scutello, pectore pedibusque posticis fuscoferrugineis; thorace hemelytrisque flavofescens, illo antice rufoferrugineo, basi nigricante; scutello basi utrimque flavo-

culato; antennis, tarsis omnibus pedibusque anterioribus flavotestaceis, illo utrimque vitta ferruginea, margine supra nigromaculato, bis ferrugineoirroratis. Long. 12, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

ALYDUS (FABR.).

1. *A. crassifemur*: obscure rufoferrugineus; antennis art. 2 basalibus nigris, 3 et 4 lutescentibus, illo apice nigro; capite nigrovario, thorace anguste nigromarginato; scutello flavovittato; subtus flavotestaceus, pectore abdomineque medio nigricantibus, illo utrimque nigrovittato; tibiis posticis curvatis, flavotestaceo-annulatis. Long. 16, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
2. *A. flavovittatus*: flavotestaceus; angulis humeralibus thoracis nigrospinosus; capite, pectore abdomineque subtus utrimque flavovittatis; tibiis posticis vix curvatis. Long. 15, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

EUTHETUS (DALLAS).

1. *E. leucostictus*: niger; capitis linea longitudinali, basali, annulis antennarum femorumque, tibiisque fuscotestaceis; scutello apice albedo; clavo, pectore utrimque maculis 2, abdominisque fascia utrimque obliqua albis. Long. 11, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In tractibus fluvii Gariep.
2. *E. leucopocillus*: niger; hemelytris flavescentibus, clavo maculaque suturali corii nigris; maculis utrimque 2 pectoris unaque abdominis, annulisque femorum albis. Long. 12, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In tractibus fluvii Limpopo.
3. *E. sordidus*: dilute flavotestaceus; capitis vittis 4 anticis, basique, thoracis apice, scutello apice excepto, pectoreque nigris; hoc utrimque albedo-bimaculato; abdomine testaceo, utrimque albedo-maculato. Long. 11, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

NEIDES (LATR.).

1. *N. malacaiplus*: flavotestaceus, antennis pedibusque dilutioribus, nigropunctatis, illarum art. 1—3 apice nigris, 4 basi albedo; femoribus apice subito clavatis, tibiis tarsisque apice nigrofuscis. Long. 8, lat. 1 millim. — Ad Portum Natalensem.

HYDARA (DALLAS).

1. *H. gracilicornis*: dilute sordide lutescens; antennarum art. ultimo fuscescente; nervis clavi obscure sanguineis; membrana sordide hyalina. Long. 11, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

GONOCERUS (LATR.).

1. *G. lituripennis*: dilute fuscescens, dense obscurius punctatus; linea media capitis thoracisque, hujus etiam marginibus, scutelli marginibus lateralibus, corii marginibus liturisque flavoalbidis; subtus cum pedibus flavoalbidus, seriatim nigropunctatus, vitta utrimque dilute fuscescente. Long. 10, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

2. *G. caffer*: dilute griseoflavescens, fuscopunctatus; capite utrimque nigropunctato; thorace antierius dilutiore, antice utrimque nigropunctato; subtus cum pedibus fuscopunctatus, abdomine punctis majoribus nigris, sexseriatim positis. Long. 7, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

CLAVIGRALLA (SPIN.).

1. *C. muricata*: obscure rufoferruginea, griseosericea; thorace angulis humeralibus valde productis, acutis, parce spinosotuberculato; scutello gibbo, utrimque trispinoso; hemelytris flavotestaceis; abdomine margine spinoso; tibiis flavoalbidis. Long. 10, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
2. *C. natalensis*: obscure rufoferruginea, griseosericea; antennis testaceis, art. ultimo nigrofusco; thorace spinosotuberculato, medio utrimque spinoso; hemelytris dilute sordide testaceis, corio margine fusco; tibiis flavoalbidis, apice fuscis. Long. 10, lat. 3½ millim. — In terra Natalensi.
3. *C. tomentocollis*: subcompressa; antennis pedibusque flavoalbidis, illarum art. 1—2 apice brunnescentibus ultimo fusco; femoribus apicem versus fuscoferrugineis, tibiis apice fuscis, medio fuscoannulatis; thorace basi utrimque spinoso, antierius flavo, posterius brunneotomentoso; scutello fusco, et flavopiloso; subtus rufotestaceus, abdomine disco et lateribus fuscescente. Long. 11, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
4. *C. pilosicollis*: flavotestacea, pilosa; thorace utrimque spinoso, macula oblonga media nigra; corio apicem versus nigropunctato; pedibus albidis, femoribus præsertim posticis apicem versus brunnescentibus. Long. 9, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

CORIZUS (FALL).

1. *C. pilosicollis*: flavotestaceus, punctatus, fuscopilosus; capite basi maculis 2 fuscis; antennis parce fuscopunctatis, pilosulis, art. ultimo obscuriore; thorace antice transversim biimpresso, ibique nigro, medio longitudinaliter levissime carinato, basi interdum maculis 4 fuscescentibus; scutello maculis 2 oblongis nigris, apice excavato, albedo; hemelytris sordide hyalinis, nervis elevatis, apicem corii versus fuscis; abdomine margine nigromaculato, subtus punctis vittaque utrimque marginali ferrugineis, femoribus ferrugineopunctatis, tarsis fuscis. Long. 8, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
2. *C. natalensis*: dilute flavotestaceus, pilosulus; antennis fuscopunctatis, art. apicali fuscescente; thorace præsertim posterius nigropunctato, ruga longitudinali media dilutiore; scutelli apice dilute rufescente; hemelytris flavotestaceo-hyalinis, nervis margineque costali ferrugineis; subtus cum pedibus valde dilute rufotestaceus, pectore pedibusque fuscoferrugineo-punctatis; abdominis margine nigromaculato. Long. 7, lat. 2½ millim. — In terra Natalensi.

3. *C. puncticornis*: præcedenti valde affinis, dilutior; antennis magis nigropunctatis; scutello basi utrimque apiceque sordide albido. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
4. *C. nigromaculatus*: testaceus, dense punctatus, pilosulus; thorace posterius scutelloque nigromaculatis; hemelytris sordide hyalinis, nervis flavescentibus, fuscobrunneo-maculatis; subtus flavotestaceus, pectore pedibusque fuscopunctatis, abdominis margine nigromaculato. Long. 5, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

ACANTHOCORIS (AM. et SERV.).

1. *A. denticulatus*: fuscobrunnescens, granosus, hispidus; antennis crassiusculis, valde hirsutus; thorace angulis humeralibus antrorsum productis, margine utrimque bispinoso, disco bituberculato; membrana fuscescente-albida, fuscomaculata. Long. 8–9, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

LYGÆUS (FARR.).

1. *L. fecialis*: sordide rufescens; antennis, capite, vitta bifurca excepta, marginibus vittisque 2 thoracis, scutello, sutura clavi, margine vittaque corii, pedibus pectoreque nigricantibus, hoc utrimque rufo-trimaculato; abdomine margine nigromaculato. Long. 14, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
2. *L. lemniscatus*: nigricans, parce griseosericeus; capitis macula basali, thoracis maculis utrimque 2 oblongis, vittaque media, margine scutellari clavi, macula prope commissuram vittaque angusta corii coccineis; pectore utrimque maculis 3, abdomine maculis marginalibus segmentique singuli fascia apicali, utrimque abbreviata, coccineis. Long. 10, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
3. *L. delicatulus*: testaceus, capitis basi, loboque medio, thoracis maculis 2 basalibus, clavi macula media, corii macula marginali, pectoris maculis 3 utrimque, abdominis maculis marginalibus membranaque nigris, hac maculis 2 albis; pedibus fuscoferrugineis. Long. 8, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
4. *L. villosulus*: dilute sordide testaceus, parce pilosus; capite, maculis 2 basalibus thoracis, membrana, apice alba excepta, antennis pedibusque nigris. Long. 6, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

RHYPAROCHROMUS (GERT.).

1. Thorace trapezoidali, margine anteriore capite latiore.

1. *R. turgidifemur*: griseoflavescens, fuscopunctatus; capite, thorace anteriori, scutello apice excepto, pectoreque nigris; antennis sordide flavotestaceis; thorace sordide flavomarginato, postice fuscopunctato, lateribus dilatatis, subparalellis; corio macula prope angulum suturalem nigra; membrana fuscescente, apice sordide albida; pedibus sordide flavotestaceis, femoribus anticis crassis, extus et intus obscurioribus, tibiis anticis curvatis. Long. $7\frac{1}{2}$, lat. 3 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.

2. *R.*

2. *R. nigromaculatus*: sordide flavescens, parcius fuscopunctatus; capite pectoreque nigroferrugineis; antennis sordide flavotestaceis, thorace anterieus abdomineque fuscoferrugineis; thorace sordide flavomarginato, lateribus subdilatatis; scutello anterieus nigro; corio macula prope angulum suturalem nigra; membrana fuscescente, apice albida; pedibus sordide flavotestaceis, femoribus anticis crassis, extus et intus obscurioribus, tibiis anticis subcurvatis. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. 3 millim. — In Caffraria interiore.
3. *R. caffer*: dilute griseoflavescens, brunneopunctatus; capite, macula magna thoracis antica, pectoreque fuscoferrugineis; antennis dilute flavotestaceis, extus nonnihil obscurioribus; thorace utrimque parum dilatato; sutura clavi margineque costali corii maculis 2 minutis obsolete, brunnescentibus; abdomine dilute fuscoferrugineo, pedibus dilute testaceis, tarsis apice fuscis. Long. $5\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
2. Thoracis margine antico capite angustiore, vel latitudine subæquali.
- a. Marginibus lateralibus thoracis plus minus dilatatis.
4. *R. marginipennis*: niger; antennis fuscoferrugineis, art. basali nigricante; thorace pone medium sabconstricto, lateribus anguste albidis; hemelytris albomarginatis, corio macula apicali albida; femoribus anticis basi, posterioribus ultra medium sordide albidis. Long. 11, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
- Variat hemelytris basi parce sordide flavovariis.
5. *R. umbrifer*: dilute flavotestaceus, fuscopunctatus et varius; capite, thorace ante medium pectoreque nigris; antennis sordide flavotestaceis, articulis apicem versus obscurioribus; thorace sordide flavomarginato, posterius fuscopunctato; scutello nigricante, maculis 2 parvis sordide flavis; membrana fuscescente; abdomine fuscoferrugineo; femoribus flavoalbidis, tibiis flavotestaceis, geniculis fuscescentibus. Long. $8\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{3}{4}$ millim. — In tractibus fluvii Gariep.
6. *R. patruelis*: sordide flavotestaceus, fuscopunctatus; capitē, thorace anterieus pectoreque nigricantibus; antennarum articulis apice fuscis, basali nigricante; thorace lateribus sordide flavomarginato, posterius fuscopunctato; corio macula oblonga prope suturam, aliaque minore apicali, nigris; pedibus flavotestaceis, femoribus apicem versus, tibiis tarsisque apice nigrofuscis. — Long. 9, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
- b. Lateribus thoracis non dilatatis.
7. *R. nigropictus*: nigricans; antennis art. ultimo a basi flavo; thorace pone medium anguste flavofasciato, posterius sordide flavescente, fuscopunctato; hemelytris sordide flavis, margine scutellari et sutura clavi, corii fasciis, una pone medium, altera apicali obliqua, nigris; membrana sordide albida; pectore basi albidofasciato; femoribus posterioribus basi flavescantibus, tibiis anticis fuscotestaceis. Long. 6, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

8. *R. curvipes*: niger vel nigropiceus, punctatus, puberulus; antennis fuscotestaceis; thorace pone medium valde constricto; hemelytris sordide flavotestaceis, clavi macula basali, corii fascia media limboque apicali nigrofuscis; membrana fusca; femoribus anticis valde incrassatis totis posticibusque apicem versus nigropiceis, his basi flavotestaceis; tibiis dilute fuscotestaceis, anticis curvatis, tarsis dilutioribus. Long. 11—13, lat. 4—5 millim. — In tractibus fluvii Gariep. et ad Rondebosch.
- Variat dilutior, thorace, femoribus anticis abdomineque subtus picescentibus.
9. *R. crassifemur*: capite, thorace anterior subtusque niger; antennis sordide flavotestaceis, art. ultimo fuscescente; thorace postice flavotestaceo, fuscopunctato; scutello-nigro, apice albido; clavo longitudinaliter fuscopunctato-striato, corio macula media aliaque apicali minore, nigris; membrana fusca, basi et apice albidomaculata; femoribus nigricantibus, posterioribus basin versus albidis, anticis incrassatis; tibiis tarsisque testaceis. Long. 9, lat. 3½ millim. — In terra Natalensi.
10. *R. apicatus*: capite, thorace subtusque ferrugineus; antennis dilutioribus; thoracis angulis humeralibus, hemelytris pedibusque flavotestaceis, corio intus longitudinaliter fuscopunctato, macula media minuta ad marginem apicalem; tarsis apice fuscis. Long. 17, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
11. *R. paganus*: capite, antennis, horum art. basali rufotestaceo excepto, fuscis, illo griseosericeo; thorace anterior ferrugineo, parte sericeo, antice posticeque dilute rufotestaceo, linea longitudinali maculisque 2 plus minus distinctis, nigricantibus; scutello fuscescente, linea media nigra; hemelytris sordide flavotestaceis, clavo corioque intus parte fuscopunctatis, hoc macula minuta ad marginem apicalem, plus minus distincta, nigra; subtus nigrofuscus, griseosericeus, abdomine margine maculisque utrimque 4 vel 5 majoribus rufotestaceis; femoribus fuscotestaceis, apice dilutioribus, anticis nonnihil incrassatis, tibiis tarsisque flavotestaceis, his apice obscurioribus. Long. 10, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
12. *R. natalensis*: præcedenti valde affinis, differt, antennis brevioribus, dilute rufotestaceis, capite thoraceque antice obscurioribus, hoc basi apiceque linea longitudinali maculisque 2 nigrofuscis. Long. 11—12, lat. 3 millim. — In terra Natalensi

ATRACTOPHORA (Stål).

(loc. cit. p. 260.)

1. *A. fusifemur*: sordide flavotestacea, fuscopunctata; capite, thorace scutelloque medio ruga longitudinali, hoc etiam callis 2 basilibus flavoalbidis; thorace lateribus nigricante; abdomine subtus vittis 2 nigris; antennis pedibusque flavotestaceis, femoribus anticis valde incrassatis, subtus nigrofuscis. Long. 13, lat. 3½ millim. — In terra Natalensi.

OXYCARÆNUS (FIEBER).

1. *O. Fieberi*: niger; hemelytris, margine albido excepto, rufescentibus, corio apice puncto nigro; membrana fusca; abdomine coccineo, posterius nigro; tibiis posterioribus albidoannulatis. Long. 5--6, lat. 2—2½ millim. — In terra Natalensi.
2. *O. albitipennis*: niger; hemelytris albidis, hyalinis, corio apice puncto nigro; abdomine coccineo, marginibus apiceque nigris; tibiis posterioribus albidoannulatis. Long. 7, lat. 2½ millim. — In terra Natalensi.

MICROPUS (SPIN.).

1. *M. fusconervosus*: niger, punctatus; capitis lobo medio, antennis (art. ultimo deest), rostro, pedibusque dilute rufotestaceis; thorace posterius picescente; hemelytris sordide albidis, nervis fuscobrunneis, corio apice brunnescente; membrana fusca, apice albida. Long. 8, lat. 1¾ millim. — In terra Natalensi.
2. *M. brevicornis*: niger, punctatus; antennarum art. 2 et 3, tibiis tarsisque sordide flavotestaceis; hemelytris sordide albidis, corio apice brunnescente; membrana sordide albida, fusconervosa; femoribus fuscopiceis, apice dilutioribus; abdomine subtus fuscoferrugineo. Long. 7½, lat. 1¾ millim. — In terra Natalensi.
3. *M. ochripes*: niger, punctulatus; antennis, art. apicali nigro excepto, pedibusque testaceis; hemelytris sordide flavotestaceis, membrana abbreviata, albida; femoribus anticis subtus denticulatis. Long. 6½, lat. 1½ millim. — In terra Natalensi.
4. *M. linearis*: niger; antennis femoribusque ultra medium fuscopiceis; thorace posterius sordide rufotestaceo; hemelytris dilute flavotestaceis, nervis nonnihil obscurioribus; membrana sordide albida, fusconervosa; femorum apice, tibiis tarsisque testaceis, his apice fuscis. Long. 4, lat. 1 millim. — In terra Natalensi.

GEOCORIS (FALL.).

1. *G. amabilis*: dilute flavotestaceus, nitidus, parce punctatus; antennis, art. ultimo excepto, nigrofuscis; thorace fascia apicali vittaque utrimque intramarginali nigris; scutello nigro vel nigropiceo; hemelytris limbo fuscopunctato, corii macula apicali fuscobrunnea; abdomine nigro, limbo flavotestaceo. Long. 4, lat. 2 millim. — In terra Natalensi. \

ODONTOPUS (LAP.).

1. *O. nigrocruciatu*s: luteus; capite, antennis, macula magna thoracis, scutello, fascia lata apiceque corii, membrana, maculis pectoris pedibusque nigris; abdomine sanguineo. Long. 14, lat. 6½ millim. — In terra Natalensi.

PYRRHOCORIS (FALL.).

1. *P. nigriceps*: niger; thorace hemelytrisque sordide rufescentibus, illo ruga antica transversa nigra; maculis pectoris, fasciis margi

neque abdominis luteis. Long. 12, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

2. *P. pectoralis*: sordide flavus; antennis, lobo medio capitis, ruga transversa thoracis, scutello pedibusque nigris, his basi luteis; pectore albo, nigro luteoque vario. Long. 10, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.

DERMATINUS (STÅL).

(loc. cit. p. 260.)

1. *D. limbifer*: niger, punctatus; marginibus lateralibus thoracis et hemelytrorum sordide flavis. Long. 7—9, lat. 3—4 millim. — In terra Natalensi.
2. *D. tartareus*: præcedenti valde affinis; differt marginibus thoracis hemelytrorumque concoloribus. Long. 7, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

DYSDERCUS (AM. et SERV.).

1. *D. nigrofasciatus*: sordide flavus; antennis, margine basali capitis et thoracis, fascia corii, membrana tibiisque nigris, femoribus rufotestaceis. Long. 16, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.

SPHINCTOTHORAX (STÅL).

(loc. cit. p. 260.)

1. *S. leucophæus*: niger, parce flavosericeus; antennarum art. 3 basi, margine extimo basali thoracis, apice scutelli, macula triangulari corii flavoalbidis. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
Cyllocoris leucophæus GRÆM. Revue Ent. V, p. 135, 36.

PHYTHOCORIS (FALL., H. SCH.).

1. *P. hottentottus*: dilute griseoflavescens; antennis parce rufopunctatis; scutello macula media nigrofusca; clavo, corio intus euneoque basi ad suturam fuscis, hujus margine apicali anguste rufescente; membrana dilute fusca; femoribus parce, dilute fuscopunctatis, posticis apicem versus obscurioribus. Long. 7, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

CAPSUS (FABR., H. SCH.).

1. *C. straminicolor*: dilute flavescens; capite antennisque rufoferrugineis, harum art. apicali, apice excepto, flavescente; cunei angulo interno membranaque fuscis, hac albidopunctata, tibiis dilute rufoferrugineis vel flavescentibus. Long. 8, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
2. *C. obscuricornis*: præcedenti valde affinis, et vix differt nisi statura nonnihil minore, antennis totis obscurioribus, cuneo apice fusco, membrana sordide albida, nervis rufescentibus. Long. 7, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
3. *C. incomparabilis*: capite subtusque dilute lutescens; antennis nigris, art. 1, 3 et 4 basi flavotestaceis; thorace nigro, vittis 3

albidis, antice dilute lutescente; scutello albido vel dilute lutescente; hemelytris nigris, corio maculis 2 albidis, cuneo macula dilute fulvescente, membrana nigrofusca; abdominis apice maculisque lateralibus nigris; femoribus basi, tibiis basi et apice nigrofuscis. Long. 6, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

4. *C. ostentans*: dilute rufotestaceus; capite vittisque 2 thoracis nigris; antennarum art. 1 rufescente, 2 nigro, 3 et 4 sordide albidis; corio macula cuneata apicali fuscescente; cuneo rufescente, apice fusco; membrana sordide albida, fuscescente-bifasciata; subtus rufescens, abdomine basi apiceque nigro; pedibus flavotestaceis. Long. 5, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

5. *C. histricus*: niger, nitidus; scutello luteo; pedibus nigris vel lutescentibus; membrana sordide albida. Long. 4, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

Var. a. Cuneo luteomaculato, pedibus nigris.

Var. b. Cuneo luteomaculato, pedibus lutescentibus.

Var. c. Thorace vitta media lutescente, cuneo nigro, immaculato, pedibus nigris.

Var. d. Thorace vitta media lutescente, cuneo immaculato, pedibus sordide flavotestaceis, fuscoannulatis.

ZOSMENUS (LAP.).

1. *Z. dilutus*: flavoalbidus, punctatus; thorace subquadrato, antice late emarginato, lateribus subrotundato-dilatato. medio longitudinaliter bicarinato; membrana albida; abdomine subtus dilute flavovirescente; pedibus, capite antennisque dilute flavotestaceis. Long. 3, lat. $1\frac{1}{4}$ millim. — In tractibus fluvii Gariep.

PHYLLONTOCHEILA (FIEBER).

1. *P. Wahlbergi*: sordide albida, dense fuscomaculata et varia; prothorace utrimque alarodilatato, disco fuscobrunnescente, carinis 3 sordide flavotestaceis; hemelytris albidis, fuscoreticulatis et irregulariter dense fuscomaculatis, area marginali valde dilatata; subtus sordide rufoferruginea, pedibus dilutioribus. Long. $5\frac{1}{2}$, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

2. *P. ataticollis*: sordide albida; thorace medio nigricante, flavotestaceo-3-carinato, utrimque alarodilatato, albido, fuscomaculato; hemelytris area marginali valde dilatata, maculis 2 fuscis instructa; subtus cum pedibus sordide rufoferruginea. Long. 4, lat. $2\frac{1}{3}$ millim. — In terra Natalensi.

TROPIDOCHHEILA (FIEBER).

1. *T. ornatella*: nigra, punctata; antennis, apice fuscescente excepto, pedibusque flavotestaceis, tarsis apice nigris; thorace margine antico carinisque 5, quarum 2 antice abbreviatis, flavoalbidis; hemelytris nonnihil dilatatis, flavoalbidis, medio apiceque fusconervosis. Long. 3, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

PHYSATOCHEILA (FIEBER).

1. *P. natalensis*: griseoalbida; capite, thorace posterius subtusque nigris; antennis pedibusque dilute flavotestaceis, illarum apice fuscis; thorace posterius albidotricarinato; hemelytris, medio excepto, fusconervosis. Long. $2\frac{2}{3}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim. — In terra Natalensi.

ELASMOGNATHUS (FIEBER).

1. *E. Fieberi*: sordide flavoalbidus; thorace vesiculoso, utrimque ampliato-rotundato, anterius 3-carinato, posterius 3-excavato; antennarum art. ultimo tarsisque dilute fuscis. Long. 4, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

E. Helferii affinis, sed (sec fig. *Fieberi*) thorace utrimque minus ampliato, et minus antrorsum producto.

BRACHYRHYNCHUS (LAP.).

1. *B. caffer*: nigropiceus, rugulosopunctatus, pedibus dilutioribus; thorace latitudine brevior, lateribus obliquis; corio apice flavotestaceomaculato; membrana fusca; abdomine subtus rufoferrugineo. Long. 5, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

ACANTHIA (FABR.).

1. *A. villosa*: ferruginea, valde villosa; thorace lateribus rotundato, elevatomarginato; hemelytris brevissimis, apice late rotundatis, punctatis. Long. $4\frac{1}{2}$, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

PIRATES (BURM.).

1. *P. ochripes*: nigricans; thorace posterius fuscotestaceo; hemelytris nigrofuscis, macula suturali indistincta dilutiore; pedibus flavotestaceis, geniculis tibiisque apice fuscis. Long. 12, lat. 4 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.
2. *P. trifenestratus*: nigricans, parce pilosus; corio medio, membrana basi, singulo macula sordide albidis. Long. 15, lat. 5 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.
3. *P. maurus*: niger, subnitidus, parce pilosus; hemelytris nigrofuscis, membrana macula basali oblonga, nigra, aliam minorem sordide albidam includente. Long. 10, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
4. *P. rubricosus*: ruber; capite, thorace antice, scutello, macula suturali hemelytrorum, membrana, fascia sordide albida excepta, pedibusque nigricantibus; femorum tibiisque basi dilute flavotestaceo. Long. 11, lat. 4 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.

METASTEMMA (AM. et SERV.).

1. *M. perpulchra*: nigra, nitida; thorace postice, scutello, hemelytrorumque basi rufis; maculis 2 corii, una media, altera apicali, pedibusque dilute flavotestaceis; femorum annulo tibiisque apice fuscis. Long. 8, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In tractibus fluvii Limpopo.

2. *M. puerilis*: dilute rufotestacea; capite thoraceque basi nigris; hemelytris albidis, macula magna fusca; pedibus dilute flavotestaceis, tibiis posticis geniculisque fuscis. Long. 6, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

GLYMMATOPHORA (Stål).

(loc. cit. p. 261.)

1. *G. submetallica*: obscure chalybeoviridis; thorace, maculis marginalibus abdominis, geniculis, tibiis tarsisque rufis, incisuris thoracis, antennis, femorumque basi nigris. Long. 19, lat. 7 millim. — Caffraria interiore.
2. *G. morio*: supra pedibusque nigra, subtus nigrochalybea; tarsis fuscotestaceis. Long. 19, lat. 8 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.
3. *G. rubripes*: capite, antennarum art. basali, thorace pedibusque rufotestaceis, abdomine pectoreque nigris. Long. 18, lat. 6 millim. — In Caffraria interiore.

NABIS (Latr.).

1. *N. caffra*: dilute griseoflavescens; capite thoraceque anterieus obscurioribus, hoc posterioribus obsolete, longitudinaliter fuscolineato; scutello fuscescente, vitta utrimque dilute flavotestacea; hemelytrorum nervo longitudinali 1 pone medium et apice macula minutissima fuscescente; pectoris disco vittaque utrimque nigricantibus; femoribus anticis extus dilute fuscovariis. Long. 9, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.

ACANTHASPIS (Am et Serv.).

1. *A. bicolorata*: nigra; thorace marginibus et pone medium, scutello, hemelytris, disco abdominis annuloque femorum anticorum luteis. Long. 19, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
2. *A. rubricosa*: rubra; antennis, capite posterioribus, rostro, art. basali excepto, impressione transversa thoracis, scutello basi, clavo, membrana, geniculis pedibusque posticis nigris. Long. 16, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
3. *A. ochracea*: flavotestacea; clavo fere toto, margine costali corii membranaque nigrofusca. Long. 16, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
4. *A. obscura*: nigra; maculis 2 hemelytrorum, una basali, altera fere apicali maculisque marginalibus abdominis dilute flavotestaceis. Long. 16, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
5. *A. coenosa*: dilute fuscotestacea; abdomine margine flavotestaceo et nigro-maculato; pedibus dilute flavotestaceis, obsolete fuscovariis. Long. 14, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
6. *A. 4-signata*: nigra, rugosa; antennis pedibusque testaceis; maculis hemelytrorum, una basali, altera fere media maculisque margi-

nalibus abdominis dilute flavotestaceis. Long. 9, lat. 3 millim.
— In terra Natalensi.

REDUVIUS (FABR.).

1. *R. nigrofuscus*: nigrofuscus; femoribus dilute flavotestaceis, fusco-biannulatis, tibiis tarsisque fuscotestaceis. Long. 22, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
2. *R. fuscoirroratus*: sordide flavescens; antennis, capite posterior, marginibus lateralibus vittisque 2 posticis thoracis, fascia apiceque hemelytrorum, maculis marginalibus abdominis, annulisque pedum nigrofuscis. Long. 20, lat. 6 millim. — Caffraria interiore.
3. *R. flavoannulatus*: fuscus; maculis hemelytrorum, una basali, altera pone medium, maculis marginalibus abdominis annulisque pedum dilute flavotestaceis. Long. 20, lat. 5 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.

OPINUS (LAP.).

1. *O. ochripes*: nigrofuscus; hemelytris dilute flavotestaceis, subhyalinis, nervis fuscis; membrana dilute fuscescente; pedibus flavotestaceis. Long. 14, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

PHONERGATES (STÅL).

(loc. cit. p. 261.)

1. *P. bicoloripes*: obscure chalybea, nitida; hemelytris nigris; pedibus anterioribus cinnabarinis, geniculis nigris; pedibus posticis nigris. Long. 17, lat. 5 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.

CLOPOPHORA (STÅL).

(loc. cit. p. 261.)

1. *C. basilica*: dilute miniata; macula basali capitis, maculis 2 thoracis, scutello, hemelytris, pectore, ano, geniculis tibiisque nigris. — Long. 15, lat. 5 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.
2. *C. limbiventris*: nigra; thorace postice limboque abdominis testaceis; macula transversa corii lutescente. Long. 15, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.

PHYSORHYNCHUS (AM. et SERV.).

1. *P. bigemmis*: nigrochalybeus; antennis hemelytrisque atris; thoracis maculis 2 minutis luteis; tibiis anticis intus tarsisque testaceis. Long. 16, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
2. *P. patricius*: thorace, geniculis, tibiis tarsisque dilute sordide miniatis; capite femoribusque obscure chalybeis; antennis hemelytrisque atris; impressionibus thoracis nigris. Long. 16, lat. 6 millim. — In Caffraria interiore.
3. *C. natalensis*: præcedenti affinis; differt tantum hemelytris ochraceis, membrana late nigrolimbata. — Long. 16, lat. 6 millim. — In Caffraria interiore.

CLEPTRIA (Stål).

(loc. cit. p. 261.)

1. *C. cinctiventris*: nigra, nitida; limbo costali hemelytrorum margineque abdominis luteis. Long. 10, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
2. *C. marginipennis*: nigra, nitida; angulis humeralibus thoracis, limbo costali hemelytrorum margineque abdominis cinnabarinis. Long. 8, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In Caffraria interiore.

-PANTOLEISTES (Stål).

(loc. cit. p. 262.)

1. *P. Princeps*: niger; antennarum art. 1 apice, 3 et 4 totis, fascia basali thoracis, annulo apicali femorum et tiliarum, harum etiam annulo fere medio sordide flavis; abdomine segmentis 3 basalibus margine testaceis. Long. 25, lat. 7 millim. — In terra Natalensi.

HARPACTOR (Lap.).

1. *H. cinnabarinus*: dilute cinnabarinus; antennis, capite, macula intra-oculari excepta, vitta lata utrimque pectoris, ano pedibusque nigris. Long. 17, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
2. *H. miniatus*: dilute cinnabarinus; antennis, macula apicali et basi capitis, fascia semicirculari thoracis, annulis 2 femorum fasciisque ventris nigris. — Long. 17, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
3. *H. sobrinus*: dilute cinnabarinus, thorace obscuriore; antennis, macula apicali et basi capitis, geniculis, tibiis tarsisque nigris; hemelytris nigrofuscis, macula lutescente; femoribus annulis 2 obsolete fuscescentibus. Long. 15, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
4. *H. scenicus*: dilute cinnabarinus; antennis, rostro, apice et basi capitis, maculis antica et magna posteriore confluentibus thoracis, hemelytris, limbo externo excepto, fasciis ventris, maculis pectoris pedibusque nigris, femoribus anticis cinnabarinobiannulatis. Long. 16, lat. 6 millim. — In tractibus fluvii Gariiep.
5. *H. nigripes*: præcedenti valde affinis, differt hemelytris, clavi margine scutellari nigro excepto, dilute miniatis. Long. 16, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
6. *H. sedulus*: sordide flavus; capite, macula media excepta, antennis, vitta lata utrimque pectoris, ano pedibusque nigris; membrana nigrofusca. Long. 15, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
7. *H. tibialis*: flavotestaceus; capite, thorace anterieus femoribusque dilute ferrugineis; antennis, macula fere apicali hemelytrorum, tibiis tarsisque nigris; membrana nigrofusca; pectore albidomaculato. Long. 14, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
8. *H. rapax*: sordide flavescens; capite, antennis, impressione thoracis, apice femorum, tibiis, fasciis maculisque marginalibus abdominis nigris; maculis, una media, altera fere apicali hemelytrorum nigrofuscis. Long. 13, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

9. *H. gracilis*: sordide flavoalbidus; capite fere toto, antennis, thorace anterioribus maculisque 2 posterioribus, maculis pectoris pedibusque nigris; hemelytris obscure testaceis. Long. 10, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
10. *H. Latro*: fuscotestaceus; capite, antennis, membrana, apice femorum tibiisque nigricantibus; rostro limboque abdominis flavotestaceis, illo apice nigro. Long. 18, lat. 5 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.
11. *H. patruelis*: obscure ferrugineus; capite, antennis, rostro, thorace anterioribus, abdomine pedibusque nigris; abdominis margine flavomaculato, tibiis anticis interdum sordide flavotestaceis. Long. 19, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.
12. *H. puberulus*: præcedenti affinis, differt rostro, apice excepto, tibiisque testaceis, abdomine rufotestaceo, vitta utrimque nigra. Long. 15, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — In tractibus fluvii Limpopo.
13. *H. dimidiatus*: nigricans; capite thoraceque testaceis, hoc posterioribus fuscescente; hemelytris ultra medium flavotestaceis; abdomine dilute miniatofasciato. Long. 19, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
14. *H. caffer*: niger; thorace posterioribus, angulis humeralibus exceptis, hemelytris rufoferrugineis; maculis marginalibus ventris luteis. Long. 12, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
15. *H. natalensis*: capite, geniculis, tibiis, femorum posteriorum annulo nigris; capite flavomaculato; thorace hemelytris rufoferrugineis, illius macula antica et limbo postico scutellique apice sordide flavis; subtus sordide flavus, macula utrimque pectoris, maculis marginalibus et lateralibus serialibus abdominis nigris. Long. 16, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
16. *H. venans*: flavotestaceus, parce flavopilosus; capite, antennis thoraceque anterioribus nigris, hoc ibidem lituris flavosericeis; fasciis maculisque marginalibus abdominis nigris; pedibus testaceis. Long. 13, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
17. *H. fasciventris*: flavotestaceus; capite, antennis, rostro, apice femorum, tibiis, tarsis abdomineque nigris, hoc margine flavotestaceo, segmentoque singulo flavofasciato. Long. 12, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
18. *H. venustus*: niger; thorace posterioribus sordide sanguineo, macula media angulisque humeralibus nigris; annulo basali femorum posteriorum anoque dilute cinnabarinis; maculis marginalibus abdominis sordide flavescens. Long. 13, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
19. *H. tristis*: niger, parce pilosus; maculis marginalibus abdominis dilute sanguineis. Long. 12, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
20. *H. carbonarius*: niger, rugulosopunctatus, pilosulus; ano maris sordide rufescente. Long. 12, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

21. *H. Pullus*: fuscoferrugineus, pilosus, præsertim pedibus; capite toto et thorace antè nigris; antennis testaceis; pedibus abdomineque disco flavotestaceis, hoc margine flavotestaceo et nigrovario; femoribus dense nigromaculatis. Long. 9, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
22. *H. ochripes*: flavotestaceus; capite, vittis 2 latis anticis thoracis, maculis 2 basalibus scutelli maculisque pectoris nigricantibus; hemelytris fuscotestaceis. Long. 8, lat. 2 millim. — In terra Natalensi.
23. *H. albopunctatus*: niger; thorace hemelytrisque parce albomucoreo-punctatis; scutello luteo; maculis pectoris albidis; maculis abdominalis marginalibus et disci, his quadriseriatim positis, luteis; tracheis albis. Long. 15, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
24. *H. nanus*: nigricans, parce flavidopilosus; hemelytris sordide hyalinis, nervis fuscescentibus; pectoris disco vittaque inæquali utrimque albidomucoreis; abdomine supra nigro, margine flavomaculato, subtus flavo, vitta angusta intramarginali, nigra. Long. 7, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

HARPAGOCORIS (STÅL).

(loc. cit. p. 262.)

1. *H. nigronitens*: niger, nitidus; macula fere apicali hemelytrorum abdomineque cinnabarinis. Long. 17, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

PHONOCTONUS (STÅL).

(loc. cit. p. 262.)

1. *P. nigrofasciatus*: sordide flavus; antennis, fascia basali thoracis, fascia media et apice hemelytrorum tibiisque nigris, femoribus testaceis. Long. 20, lat. 6 millim. — In terra Natalensi.

ARILUS (HANN).

1. *A. pilipes*: fuscotestaceus, totus pilosulus; thoracis margine postico anguste testaceo; abdomine subtus testaceo, segmentis 2 ultimis, præsertim penultimo, dilatatis. Long. 18, lat. 5 millim. — In terra Natalensi.
2. *A. atrox*: fuscotestaceus, sericeus, totus pilosulus; abdomine utrimque rotundato-dilatato, subtus seriebus 2 punctorum nigrorum, segmentis anguste flavotestaceo-marginatis. Long. 20, lat. 8 millim. — In terra Natalensi.

SPIIAGIASTES (STÅL).

(loc. cit. p. 262.)

1. *S. horrificus*: flavosericeus; capite thoraceque fuscis, spinis hujus, antennarum art. basali, scutello utrimque, nervisque hemelytrorum flavotestaceis; membrana fuscocuprescente, apice albohyalino-irrorata; abdomine subtus utrimque fasciis obliquis, fuscis. Long. 15, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

LAPHYCTES (STÅL).

• (loc. cit. p. 263.)

1. *L. pallidus*: flavotestaceus; antennis pedibusque dilutioribus, illis obsolete fuscoannulatis; femoribus medio nigrobipunctatis, apice fusciscentibus; spinis humeralibus thoracis nigris; corio apice obscuriore. Long. 20, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

ONCYLOCOTIS (N. Gen.).

Caput ante oculos conicoproductum, pone oculus vesiculosum, oculis sat magnis, prominentibus; antennis capite cum thorace vix longioribus, crassis, art. 1 minimo, capitis apicem non superante, reliquis inter se longitudine æqualibus; rostro capite tertia parte brevior. Thorax anterieus angustior, ante et pone medium constrictus. Hemelytra abdominis longitudine, nervis longitudinalibus subfurcatis, membrana nulla. Pedes mediocres, femoribus anticis incrassatis, tibiis anticis apicem versus sensim dilatatis, apice truncatis, tarsis anticis reliquis crassioribus et brevioribus.

1. *O. nasutus*: dilute flavotestaceus; oculis nigrofuscis; hemelytris dilute sordide flavotestaceis. Long. 6, lat. 1½ millim. — In terra Natalensi.

ZAICA (AM. ET SERV.).

1. *Z. Wahlbergi*: læte sanguinea; thorace posteriori utrimque scutelloque apice longe spinosis, spinis flavoalbidis, apice nigris; hemelytris flavotestaceis, margine sanguineis. Long. 15, lat. 2½ millim. — In terra Natalensi.

ONCOCEPHALUS (BURM.).

1. *O. amulipes*: dilute flavotestaceus; antennarum art. 1 fuscobiannulato; hemelytris macula oblonga clavi, maculis 2 corii, maculis basali et oblonga media membranæ nigrofuscis; tibiis anticis basi et apice fuscis, tibiis anticis et posticis medio fuscoannulatis. Long. 18, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
2. *O. cancellatus*: thorace pectoreque fuscis, illo lineis 4 longitudinalibus unaque transversa flavotestaceis; hemelytris, pedibus abdomineque flavotestaceis, hoc vitta utrimque maculaque membranæ fusciscentibus. Long. 11, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.
3. *O. sordidus*: flavotestaceus; pedibus subtusque fuscoirroratus; maculis basali et media membranæ fusciscentibus. Long. 11, lat. 3 millim. — In terra Natalensi.

STENOPODA (LAP.)

1. *S. caffra*: sordide flavotestacea, pedibus dilutioribus; macula oblonga media clavi, maculis basali et oblonga media membranæ fuscis; tibiis anticis basi, apice annuloque medio fuscis. Long. 18, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.
2. *S. capensis*: dilute testacea; capite vittisque angustis thoracis albidosericeis; pedibus subtusque fuscoferrugineis, tibiis testaceis. Long. 16, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

TRIBELOCEPHALA (STÅL).

(loc. cit. p. 263.)

1. *T. boschjesmana*: terrea, excavato-rugulosopunctata; membrana fuscobrunnea; abdomine pedibusque sordide flavis, dense terreo-sericeis. Long. 11, lat. 4 millim. — In terra Natalensi.

RHAPHIDOSOMA (AM. et SERV.).

1. *R. ambulator*: antennis rufotestaceis; capite thoraceque dense flavotestaceo-farinoso, hoc tricarinato; femoribus nigrofuscis, tibiis rufotestaceis. Long. 22, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
2. *R. carinatum*: flavotestaceum; thorace tricarinato; abdomine supra longitudinaliter 5-carinato, carina media basin versus dentata. Long. 22, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
3. *R. circumvagans*: nigrofuscum; capite, thorace subtusque dense breviter albidosericeum. Long. 22, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

LOPODYTES (STÅL).

(loc. cit. p. 263.)

1. *L. grassator*: fuscotestaceus, pilosulus; spinis 2 parvis basalibus thoracis nigris; hemelytris flavotestaceis, membrana sordide hyalina. Long. 20, lat. 1 millim. — In terra Natalensi.

EMESA (FABR.).

1. *E. Wahlbergi*: nigrofusca; thorace vittis 5 subaureomicantibus; hemelytris pedibusque posticis dilute flavotestaceis, femoribus posterioribus apice, tibiis posterioribus basi fuscoannulatis; pedibus anticis nigrofuscis, flavotestaceo-maculatis. Long. 10, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.
2. *E. gracilis*: dilute flavotestacea; hemelytris sordide albidohyalinis; abdomine subtus fuscescente. Long. 5, lat. 1 millim. — In terra Natalensi.

HYDROMETRA (LATR.).

1. *H. ambulator*: nigrofusca; thorace utrimque vitta brunnescente; hemelytris linea longitudinali media albida; pedibus testaceis, geniculis tarsisque fuscis. Long. $9\frac{1}{2}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim. — In terra Natalensi.

TENAGOGONUS (STÅL).

(loc. cit. p. 263.)

1. *T. albovittatus*: supra brunnescens, subtus dilute sordide flavescens, albidosericeus; capitis vittis tribus tuberculisque antenniferis, thoracis linea longitudinali posteriori evanescente, vittis 2 anticis abbreviatis, 2 lateralibus aliam dilute flavotestaceam includentibus rostrique art. ultimo nigris; antennis pedibusque fuscotestaceis, his nonnihil dilutioribus. Long. 7—9, lat. $3-3\frac{1}{2}$ millim. — In terra Natalensi.

VELIA (LATR.).

1. *V. albidotincta*: sordide flavotestacea; thoracis disco obscuriore, maculis 2 anticis albidosericeis; hemelytris fuscis, parce flavosericeis, vitta basali maculisque 6 apicalibus albis; pectore abdominisque disco fuscobrunnescentibus, illo parce albosericante; tibiis fuscescente-annulatis. Long. 5, lat. 2 millim. — In tractibus fluvii Limpopo.

MONONYX (LAP.).

1. *M. limigenus*: sordide flavotestaceus, thorace scutelloque medio obscurioribus; capite basi apiceque bituberculato. disco 4-tuberculato; thorace utrimque dilatato, medio gibbo, transversim biimpresso, antice pone caput 5-tuberculato, posterius septemcostato; scutello utrimque tuberculato, basi apiceque transversim curvato-costato; hemelytris parce, breviter setosopenicillatis; femoribus anticis fuscis, posterioribus annulatis; abdomine nigropiceo, maculis marginalibus, aliisque dupplo serie utrimque positis, lutescentibus. Long. 9—10, lat. 7—8 millim. — In terra Natalensi.

PELEGONUS (LATR.).

1. *P. caffer*: nigrofuscus, maculis minutis glaucis sparsus; thoracis marginibus lateralibus posticoque testaceis; subtus nigricans, cinerascens, abdominis margine sordide flavomaculato; pedibus flavotestaceis, tarsis nigroannulatis. Long. 5, lat. $2\frac{3}{4}$ millim. — In terra Natalensi.

NAUCORIS (GEOFFR.).

1. *N. limicola*: dilute flavotestacea; capite medio longitudinaliter et basi, thorace disco transversim irregulariter, scutelloque medio fuscopunctatis; hemelytris densissime fuscopunctatis, margine suturali et costali basali flavotestaceis; abdominis disco interdum fuscescente. Long. 9, lat. 6 millim. — In fluviis Limpopo et Gariiep.

DIPLONYCHUS (LAP.).

1. *D. coenosus*: *D. rustico* valde similis, sed capite nonnihil brevior, thorace basi parum angustiore ut et hemelytris basi magis rotundatodilatatis differt. Long. 14, lat. 9 millim. — In terra Natalensi.

ILYOTREPES (STRÅL).

(loc. cit. p. 264.)

1. *I. herculeus*: sordide flavotestaceus; capitis maculis longitudinali basali apicalibusque utrimque fuscis; thorace posterius nigropunctato, lateribus fuscobrunneo-irrorato, macula magna quadrata disci fuscobrunnescente, per lineam longitudinalem flavotestaceam divisa; scutello basi transversim impresso, macula magna quadrata nigrofusca, rugosopunctata, per lineam flavotestaceam divisa; femoribus, praesertim subtus, fuscomaculatis, tibiis anticis fuscobrunnescentibus. Long. 57—65, lat. 24—28 millim. — In terra Natalensi.